

Ackerbohnen

Hinweise

Unkrautbekämpfung

Vorauflauf und Nachauflauf
Unkräuter und Ungräser (speziell Amarant und Nachtschatten)

Einjährige Unkräuter und Gräser

Einjährige Unkräuter und Gräser

Ungräser, Hirsen, Raygras, Ausfallgeteide, Quecke

Schädlingsbekämpfung

Schnecken

Erdräupen

Blattläuse

Vergrämung

Starter und Booster

Für starke Wurzelbildung

Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.

Bolero 1 l/ha

Frontier X2 +
1,2 - 1,4 l/ha

Caravel 0,25 l/ha

Laguna 3 l/ha

Agil 1 - 2,5 l/ha


Amilon 5 5-7 kg/ha

Techno 10 CS 0,075 l/ha

Pirimo 0,15 kg/ha

Penergetic b VV 0,7 kg/ha 

Penergetic b WV 0,6 kg/ha 

Polygrün 1-5 l/ha 

Level 2 0,8 l/ha 

Penergetic p Feldbau 100 g/ha  + **Vital** 1 l/ha 

Polygrün Blüte 1-2 l/ha 

+ **Vital** 1 l/ha 

Im Vorauflauf mischbar mit Frontier X2.

(GWS)

Anwendung ab 1. echtem Blatt bis vor Bildung der ersten Blütenknospen. Quecke 2-2,5 l/ha.

Nur mit Sonderbewilligung. (GWS)

Nicht mehr als 700 g des Wirkstoffes Metaldehyd pro ha auf derselben Parzelle innerhalb eines Jahres anwenden.

Bei Auftreten, schont Nützlinge. (GWS)

Mischbar mit Herbiziden.

Reduziert Schäden und Nutzpflanzen durch Wildtiere.

1-2 Behandlungen.

Keimblatt -
2-Blatt

10-12

Vorauflauf

Vor der Saat

3-4 Blatt

13-14

Bildung
Blütenknospen

50-59

Hülsenbildung

70-79