

Stade BBCH	Mi-avril	Fin avril	Mi-Mai	Fin Mai	Mi-Juni	Fin Juni	Mi-juillet post floraison- chute des fruits	Fin juillet	Mi-août	fin août	Mi-septembre	Fin septembre	Mi-octobre récolte
	50-52	53-56	57	59	65	69	72	74	77	81	85	87	89
<b>Maladies</b>	Silwet L-77 0,1 l/ha à 0,1 l/ha à chaque application pour les volumes de bouillies réduits (100-150 l/ha) améliore la distribution de la matière active.												
<b>Maladies des feuilles</b>	<b>Flowbrix</b> 0,25 = 4 l/ha	<b>Flowbrix</b> 0,125 = 2 l/ha	<b>Legan WG</b> 0,03 % = 0,48 kg/ha	<b>Bogard</b> 0,015 % = 0,24 l/ha + <b>Legan WG</b> 0,03 % = 0,48 kg/ha	<b>Legan WG</b> 0,03 % = 0,48 kg/ha	<b>Bogard</b> 0,015 % = 0,24 l/ha + <b>Legan WG</b> 0,03 % = 0,48 kg/ha	<b>Folpet 80 WDG</b> 0,0125 % = 2 kg/ha	<b>Folpet 80 WDG</b> 0,0125 % = 2 kg/ha	<b>Flint</b> 0,015 % = 0,24 kg/ha + <b>Folpet 80 WDG</b> 0,1 % = 1,6 kg/ha	<b>Folpet 80 WDG</b> 0,125 % = 2 kg/ha + <b>Quiz</b> 0,225 % = 1 l/ha	<b>Folpet 80 WDG</b> 0,125 % = 2 kg/ha + <b>Quiz</b> 0,225 % = 1 l/ha	<b>Folpet 80 WDG</b> 0,125 % = 2 kg/ha + <b>Quiz</b> 0,02 % = 0,32 l/ha	Bogard: max. 4 applications, mélanger avec Legan 3400 g/ha, jusqu'à fin juillet. Délai d'attente 3 semaines.  Legan WG: max. jusqu'à fin juin.  Folpet: Délai d'attente 3 semaines.  Celos: Tenir compte de la compatibilité. Pas de délai d'attente.
<b>Maladies de conservation</b>													
<b>Oïdium</b>		<b>Celos</b> 0,5 % 8 kg/ha	<b>Celos</b> 0,3 % 4,8 kg/ha		<b>Celos</b> 0,3 % 4,8 kg/ha		<b>Celos</b> 0,3 % 4,8 kg/ha	<b>Celos</b> 0,3 % 4,8 kg/ha		<b>Celos</b> 0,3 % 4,8 kg/ha	<b>Celos</b> 0,3 % 4,8 kg/ha	<b>Celos</b> 0,3 % 4,8 kg/ha	
<b>Feu bactérien</b>	<b>Penergetic b</b> 0,4 kg/ha	<b>Penergetic p Fruits</b> 0,25 kg/ha + <b>Vital</b> 1 l/ha						plusieurs fois par saison			<b>Penergetic b</b> 0,4 kg/ha + <b>Terrasan</b>		
<b>Ravageurs</b>													
Pucerons			<b>Pirimor</b> 0,04 % 640 g/ha				<b>Pirimor</b> 0,04 % 640 g/ha incl. pucerons lanigère			<b>Pirimor</b> 0,02 % 0 320 g/ha			
Phalène/tordeuse		<b>Rapid</b> 0,2 % 3,2 kg/ha					<b>Rapid</b> 0,2 % = 3,2 kg/ha						
Cochenille	<b>Spray Oil</b> 3,5 %, 56 l/ha												
Cheimatobies			<b>XenTari</b> 0,1 % 1,6 kg/ha			<b>XenTari</b> 0,1 % 1,6 kg/ha							
Phytoptes													
Acarions tétraniques							<b>Crede</b> 0,02 % 0,32 l/ha						Avant et après la fleur jusqu'au 30 juin. Utilisation de Crede ou Nissostar sur la même parcelle seulement une fois par année.
Acarien rouge		<b>Spray Oil</b> 2 %, 32 l/ha											
Ériophyides libres		<b>Celos</b> 0,5 - 0,75 % 8-12 kg/ha					<b>Celos</b> 0,5 - 0,75 %						
Punaises des fruits			<b>Audienz</b> 0,02 % 0,32 l/ha			<b>Audienz</b> 0,02 % 0,32 l/ha							
<b>Pollinisation</b>				<b>Koppert - Tripol - Bourdons</b> 3-5 unités									
<b>Engrais</b>								<b>HBR</b> 1 l/ha					
Bore / Calcium							<b>Micro Bor</b> max. 3 l/ha (Split)			<b>Basfoliar</b> 4-8 x 3-10 l/ha			
Renforcement des plantes			<b>Polygrün</b> 0,5-1 l/ha	<b>Polygrün Blüte</b> 2 l/ha			<b>Polygrün</b> 0,5-1 l/ha			<b>Fetrilon Combi</b> 0,1-0,15 % 1 kg/ha			
Qualité des fruits					<b>Noctudor</b> 4 l/ha								
<b>Nouvelle plantation</b>		<b>Kickstart</b> 250 ml/400 l d'eau (arroser) plusieurs fois				<b>LiqHumus</b> 35-45 l/ha répartis sur plusieurs applications (5-10 l/ha) pendant la saison, pulvériser sur la bande racinaire.				<b>Perlhumus</b> 10-15 kg/m <sup>2</sup> au sol ou oder 150-400 kg/ha			