



	Produkt				Anwendung	Hinweise
						WF = Wartezeit in Tagen
	Brombeeren					Bei Fungiziden und Insektiziden Basiswassermenge 1000 l/ha.
	Himbeeren					
	Ribes-Arten					
	Schwarzer Holunder					
	Heidelbeeren					
Einj. Ungräser/Unkräuter	•	•	•	Galipan	2,5 l/ha	21 Im Frühjahr, vor dem Austrieb.
Einj. Ungräser/Unkräuter	•	•	•	Granat	2,5-6.25 l/ha	21 ausser Jostabeeren.
Einj. Ungräser, Quecke	•	•	•	Agil	0,75-2,5 l/ha	Anwendung: 2-3 Blattstadium der Ungräser.
Ungräser, Unkräuter	•	•	•	Glifonex TF	2-10 l/ha	Einzelstockbehandlung
	•	•	•	Landmaster Supreme 480 TF	1,5-7,5 l/ha	
Winden	•	•	•	MCPB LG	0,4 % 4 l/ha	Nur Johannisbeere
Echter Mehltau	•	•	•	Carbyc Pro	0,5-1%	Anwendung Stadium BBCH 12-89.
Echter Mehltau	•	•	•	Diagonal	1 l/ha	Max. 3 Behandlungen pro Parzelle/Jahr.
Rutenkrankheit	•	•	•	Diagonal	1 l/ha	Max. 3 Behandlungen pro Parzelle/Jahr.
Rutenkrankheit	•	•	•	Cuproxat flüssig	0,5-1,3 %	Anwendung: Vor der Blüte und nach der Ernte.
	•	•	•	Flowbrix	0,25-0,6 %	
Blattfallkrankheit	•	•	•	Cuproxat flüssig	0,25-0,75 %	21 Anwendung: Unmittelbar nach der Blüte und nach der Ernte.
	•	•	•	Flowbrix	0,15-0,4 %	21
Rost der Himbeere	•	•	•	Bogard	0,5 l/ha	Anwendung: Max. 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr. Vor der Blüte und nach der Ernte. (GWS)
Echter Mehltau	•	•	•	Bogard	0,5 l/ha	
Mondscheinigkeit	•	•	•	Diagonal	1 l/ha	21 Nur Johannisbeere
Mondscheinigkeit	•	•	•	Switch	0,1 % 1 kg/ha	7 Ausser Jostabeeren
Botrytis	•	•	•	Switch	1 kg/ha	14/7 Maximal 1 Behandlung pro Jahr. Maximal 2 Behandlungen pro Jahr. (GWS)
Rutenkrankheiten	•	•	•	Flint	0,2-0,3 kg/ha	Anwendung: Maximal 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
Roste	•	•	•	Penergetic p Reben + Vital	0,25 kg/ha 1 l/ha	
Zweig- und Beerenkrankheit	•	•	•			Ausgenommen Jostabeeren.
Echter Mehltau	•	•	•			Nur Stachelbeeren.
Graufäule (Botrytis cinerea)	•	•	•			
Mondscheinigkeit	•	•	•			
Falscher Mehltau	•	•	•	Booster	0,4 % 4 l/ha	21 Max. 2 Behandlungen.
Wurzelsterben	•	•	•	Booster	0,4 % 4 l/ha	Spritzen oder Giessen.
Blatrfressende Raupen, Blattwespen, Frostspanner, Spanner, Thripse, Wanzen	•	•	•	Audienz	0,02 %	3 Max. 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr. Behandlung im Abstand von 7/10 Tagen.
Kirschessigfliegen	•	•	•	Audienz	0,02 %	3 Max. 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
Eulenraupen	•	•	•	XenTari	0,1 % 1 kg/ha	3 Nur gegen junge Larvenstadien.
Austern- und Napfschildläuse, Frostspanner, Spinnmilben	•	•	•	Spray Oil 7-E	3,5 %	Anwendung: Stadium BBCH 00-10 (B-C).
Frostspanner, Spinnmilben, Napfschildläuse	•	•	•	Spray Oil 7-E	3,5 %	Napfschildlaus hat beim Holunder keine Bewilligung.
Gallmilben	•	•	•	Celos	2 % 1 %	Kurz vor dem Austrieb. Als 2. Behandlung bei starkem Befall nach Austrieb, bei 15-20 cm Trieblänge.
Blattläuse	•	•	•	Pirimor	0,04 %	21 Anwendung: Stadium BBCH 00-10 (B-C). (GWS)
Blütenstecher	•	•	•	Techno 10 CS	0,02 %	21
Himbeerkäfer	•	•	•	Techno 10 CS	0,01 %	21 (GWS)
Spinnmilben (Eier und Larven)	•	•	•	Credo	0,04 %	Anwendung: Vor der Blüte nach der Ernte. Giessen. Max. 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr. (GWS)
Blattsaugende Insekten	•	•	•	Siltac plus	0,15 %	Spritzbrühe muss schnell antrocknen.
Blattläuse, Spinnmilben	•	•	•	Vista	2 % 20 l/ha	7 Behandlung nach Bedarf wiederholen.
Blattdünger	•	•	•	Hi-Grow	1 % 5 l/ha	Mischbar mit Fungiziden.

Getreide
Mais
Herbizid-Wirkungstabelle
Kartoffeln
Rüben/Raps
Soja / Erbsen / Sonnenblumen
Feldbau div.
Futterkonservierung
Weinbau
Kernobst/Steinobst
Gemüse/Beeren
Zierpflanzenbau
Nützlinge