

Produkt	Anwendung	Hinweise
---------	-----------	----------

Brachen und Stoppfelder

Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.

Herbizide:

Brache, Frässaaten, Mulchsaaten

Glifonex TF	2-3 l/ha 4-6 l/ha 4-10 l/ha
--------------------	-----------------------------------

Einjährige Unkräuter und Ungräser.
Mehrjährige Gräser.
Mehrjährige Unkräuter, bei Winden 10 l/ha verwenden.

Brache, Frässaaten, Mulchsaaten

Landmaster Supreme 480 TF	3-5 l/ha 3-7,5 l/ha
----------------------------------	------------------------

Einjährige Unkräuter und Ungräser.
Mehrjährige Gräser.
Mehrjährige Unkräuter, bei Winden 7,5 l/ha verwenden.

bei Winden, Blacken, Disteln

Dialen	0,5 l/ha
---------------	----------

In Tankmischung mit 5 l/ha Glifonex TF oder 4 l/ha Landmaster Supreme. Letzte Anwendung Ende September.

Wiesen und Weiden

Herbizide:

a) Neusaaten

Azofix plus und Fosfix plus je 1-2 l/ha

Mit Herbizid oder in Gülle.

MCPB LG	2 l/ha
+ Effican SG	1,1 kg/ha

In Neusaaten vor dem 1. Schnitt. Der Klee muss 2 echte Blätter aufweisen. Wartefrist: 3 Wochen, nicht laktierende Tiere 2 Wochen. Keine Anwendung in Alexandriner und Perserklee.

Mit jungen Blackensämlingen

MCPB LG	4 l/ha
+ Asulam LG	1 l/ha

Ab 2-Blatt-Stadium des Klees. Keine Anwendung in Alexandriner und Perserklee. Wartefrist: 3 Wochen, nicht laktierende Tiere 2 Wochen.

Kleegrasmischungen

Lentagran	1 - 2 kg/ha
------------------	-------------

Im Herbst bis Mitte Oktober. Wartefrist: 3 Wochen, nicht laktierende Tiere 2 Wochen.

Luzerne

Effican SG	2 x 0,55 kg/ha
-------------------	----------------

Splitbehandlung. Wartefrist: 3 Wochen. **(GWS)**

Lentagran 600 EC	1,5 l/ha
-------------------------	----------

Splitbehandlung 2 x 0.75 l/ha. Wartefrist: 28 Tage.

Starterdünger

Level 2	0,8 l/ha
----------------	----------

Behandlung wenn Klee 4 echte Blätter hat. Mischbar mit Herbiziden.

b) Flächenbehandlung:

Blacken

Asulam LG	4 l/ha
------------------	--------

Anwendung Frühling und Herbst. Vor Bildung der Blütenstände. Wartefrist: 3 Wochen, nicht laktierende Tiere 2 Wochen.

Alpenblacken, Farne

+ Flüssigdünger	4 l/ha
------------------------	--------

Asulam LG	6-8 l/ha
------------------	----------

+ Flüssigdünger	4 l/ha
------------------------	--------

Flüssigdünger fördert die Wirkung. Wartefrist: 3 Wochen, nicht laktierende Tiere 2 Wochen.

Blackensämlinge und andere breitblättrige Unkräuter

MCPB LG	4 - 6 l/ha
----------------	------------

In Kleegras-Neusaaten und Einsaaten vor 1. Schnitt. Der Klee muss 2 echte Blätter entwickelt haben. Behandlung bei wüchsigen Wetter. Wartefrist: 3 Wochen, nicht laktierende Tiere 2 Wochen.

Hahnenfuss

MCPB LG	4 - 6 l/ha
----------------	------------

Im 2. Aufwuchs. Behandlung bei wüchsigen Wetter. Wartefrist: 3 Wochen, nicht laktierende Tiere 2 Wochen.

Disteln, Weisses Germer, Rumex-Arten

Duplosan KV Combi	2,5 - 3,25 l/ha
--------------------------	-----------------

Unkräuter, Ungräser

Landmaster Supreme 480 TF	3-7,5 l/ha
----------------------------------	------------

Flächenbehandlung; vor Neusaat.

c) Einzelstockbehandlung

Blacken, Bärenklau, Kerbel, Brennessel, St. Jakobskreuzkraut u.a.

Blackex	Mischverhältnis 1:2
----------------	---------------------

Enthält roten Farbstoff zum besseren Erkennen behandelter Pflanzen. Anwendung mit Sprüh- und Spritzgeräten. Wartefrist: 3 Wochen, nicht laktierende Tiere 2 Wochen.

Giftige Kreuzkräuter, Weisses Germer

Zwei 4-D	0,4 - 0,5 %
-----------------	-------------

Brombeersträucher, Giftige Kreuzkräuter, Japanischer Knöterich, Mehrjährige Disteln, Blacken.

Simplex	0,5-2,5 %
----------------	-----------

Rückenspritze/Handspritzgeräte, bis Ende August. Wartefrist: 3 Wochen.

Stumpflättriger Ampfer (Blacken)

Asulam	1 %
---------------	-----

Wartefrist: 3 Wochen, nicht laktierende Tiere 2 Wochen.

Unkräuter, Ungräser

Landmaster Supreme 480 TF	0,5-7,5 %
----------------------------------	-----------

Rückenspritze / Handspritzgerät.

Biodiversitätsförderflächen (BFF) gemäss DZV

Ackerkratzdistel, Stumpflättriger Ampfer (Blacken), Gemeine Quecke, Winden

Glifonex TF	5 - 10 %
Landmaster Spreme 480 TF	5 - 7,5 %

Ausbringung mit Handspritzgeräten ohne Rückenspritze.

Brombeersträucher, Giftige Kreuzkräuter, Japanischer Knöterich, Mehrjährige Disteln, Blacken.

Simplex	0,5-2,5 %
----------------	-----------

Einzelstockbehandlung, bis Ende August. Wartefrist: 3 Wochen

Giftige Kreuzkräuter (Senecio spp.)

Zwei 4-D	0,15ml/m ²
-----------------	-----------------------

Nur Einzelpflanzenbehandlung.