

Cetrioli e zucche

	Cetrioli, cetrioli da inscatolare, cetriolini					GA = Giorni di attesa	
	Anguria	Melone	Zucca da olio	Zucca con buccia commestibile	Zucca con buccia non commestibile		
Dicotiledoni e monocotiledoni annuali (piena terra)	●			●		Goltix 700 SC 5 l/ha	Applicazione tra le file. Massimo 1 trattamento per coltura. Pre-emergenza: Subito dopo la semina
Dicotiledoni e monocotiledoni annuali (piena terra)			●	●		Caravel 0,25 l/ha	
Gommosi delle cucurbitacee [Didymella bryoniae]	●					Bogard 0,5 l/ha	3 Massimo 3 trattamenti. (SPe)
Alternaria, oidio, cladosporiosi				●		Bogard 0,5 l/ha	3 Massimo 3 trattamenti. (SPe)
Peronospora	●			●		Booster 3,5 l/ha	15 Massimo 3 trattamenti per coltura.
Oidio	●	●	●	●	●	Carbyc Pro  1 % 3-5 kg/ha	1 Utilizzare allo stadio BBCH 12 - 89.
Oidio	●	●	●	●	●	Celos  0,1-0,2 % 1-2 kg/ha	3 Attenzione alle temperature.
Oidio	●	●	●	●	●	Microthiol LG  2 l/ha	3
Antracnosi, ticchiolatura	●		●	●		Diagonal 0,08 % 0,8 l/ha	3 Massimo 2 trattamenti per coltura/anno.
Oidio / Peronospora	●	●	●	●	●	Diagonal 1 l/ha	21 Massimo 2 trattamenti per coltura/anno.
Oidio / Peronospora (in serra)	●		●	●		Diagonal 0,1 % 1 l/ha	3 Massimo 2 trattamenti per coltura/anno.
Oidio,	●			●		Flint 0,05 % 0,5 kg/ha	3 Trattare a partire dall'attacco.
Gommosi delle cucurbitacee	●	●	●	●	●	Flint 0,25 kg/ha	3 Massimo 3 trattamenti.
Effetto parziale: Maculature angolari, peronospora delle Cucurbitacee	●					Flowbrix  2 l/ha	21 Primo trattamento: dall'inizio dell'attacco. Trattare poi a intervalli di 7-10 giorni. Prodotto di alta qualità.
	●					Cuproxat liquido  4 l/ha	21
	●					Kupfer Bordo LG 0,5 % 5 kg/ha 	21
Botrite (in serra)	●					Prestop  0,5 %	- Massimo 4 trattamenti con 3 settimane
Gommosi delle cucurbitacee (in serra)	●					Prestop  1 %	- Ripetere i trattamenti a intervalli di 3-4 settimane.
Malattie causate da funghi patogeni del suolo [Fusarium spp, Phytophthora spp, Pythium spp, Rhizoctonia spp].	●					Prestop  0,5 kg/m ³	- Irrigazione prima della semina o della piantagione. Coltivazione di giovani piante e trattamento dei semenzai.
Peronospora (in serra)	●	●	●	●	●	Ranman Top 0,5 l/ha	3 Massimo 2 trattamenti
Botrite, sclerotinia	●					Switch 0,1 %	3 Massimo 2 trattamenti per coltura. (SPe)
Bruchi, tripidi		●	●		●	Audienz  0,2 l/ha	3 In serra, massimo 3 trattamenti.
Afidi, minatrici, nottue, tripidi	●	●	●	●	●	Techno 10 CS 0,1 l/ha	3 Periodo di attesa per la zucca d'olio: 14 giorni
Afidi, tripidi	●	●	●	●	●	Siltac plus  0,1 %	- 2-3 trattamenti a 7-10 giorni d'intervallo.
Afidi	●	●	●	●	●	Pirimor 0,05 %	7 Rispetta gli ausiliari (senza l'afide del melone).
Nottue	●	●	●	●	●	Rapid 0,15 % 1,5 kg/ha	3 Massimo 2 trattamenti per anno. (SPe)
Acari (uova, larve)	●	●	●	●	●	Credo 0,32 l/ha	7
Afidi, acari rossi	●	●	●	●	●	Vista  20 l/ha	7 Cercare di bagnare bene le piante.
Afidi, acari rossi	●	●	●	●	●	Piretro verde 2,5 l/ha	3 Cercare di bagnare bene le piante.
Nottue	●	●	●	●	●	XenTari  0,1 % 1 kg/ha	3
Senità del fogliame	●	●	●	●	●	Dexa Pro  0,7-1 %	Trattamento a intervalli di 7-14 giorni.
Concime con magnesio	●	●	●	●	●	Olimag  0,4-0,8 %	Utilizzare allo stadio BBCH 12 - 89.
Riduzione dello stress per i primi afidi	●	●	●	●	●	Pidel  4 l/ha %	Applicazione: al primo avvistamento degli afidi
Carenza in ferro (per es. cocomeri verdi in serra)	●	●	●	●	●	Ferplus Top 0,3-0,7 kg/are	Fresatura prima della semina o lavorazione dopo la semina).