

			DA = Délai d'attente en jours
Épinard			
Graminées, repousses de céréales, chiendent	Agil	1-2,5 l/ha	21
En post-levée	Betam LG	2x 0,8 l/ha Split	21
Mono et dicotylédones annuelles	Caravel	50-100 ml/ha	
Herbicide de pré-levée	Goltix 700 SC + Spark	1 l/ha 0,8 kg/ha	
Dicotylédones annuelles	Spark	1,5-2 kg/ha	
Mildiou de l'épinard, cladosporiose de l'épinard	Bion	30 g/ha	7
Mildiou	Revus	0,6 l/ha	7
Mildiou véritable	Carbyc Pro	1% 4 kg/ha	1
Alternaria	Sambesi Pro	4 l/ha	
Maladies des feuilles	Quiz Pro	1,5 l/ha	
Noctuelles terricoles ou défoliatrices	Audienz	0,2-0,4 l/ha	7
Mouches mineuses, mouche de la betterave	Audienz	0,2 l/ha	7
Thrips	Audienz	0,2 l/ha	7
Pucerons, mouches blanches	Piretro verde	2,5 l/ha	3
Pucerons	Pirimor	0,5 kg/ha	14
Pucerons de feuillage, noctuelles terricoles, mouches mineuses, thrips, altises	Techno 10 CS	0,1 l/ha	7
Chenilles défoliatrices	XenTari	1 kg/ha	3
Extrait de châtaignier	Dexa Pro	3 l/ha	
Solution au sulfate de magnésium	Olimag	3 l/ha	
Extrait d'algue avec soufre	Pidel	1% 4 l/ha	
Engrais	Miligard	1% 4-5 kg/ha	
Carence en oligo-éléments	Fetrilon-Combi 1	1 kg/ha	
Amélioration de la croissance	Engrais liquide LG	5 l/ha	
Amélioration de la croissance	Kickstart	0,15 l/ha	

Au stade cotylédons des adventices. Ne pas traiter sous conditions météorologiques extrêmes. Pré-levée, immédiatement après le semis.

Épinards au printemps et en été. (SPe)
Dosage plus élevé dans un sol riche en humus. (SPe)

(plein air) 2 traitements.
(en serre) 1 traitement.

Application répétée.
Application répétée.
Application répétée.

Max. 1 traitement par culture et année.

Max. 3 traitements par culture avec un intervalle de 7 jours.

Max. 2 traitements par culture avec un intervalle de 7 jours.

Max. 4 traitements par culture et par année avec un intervalle de 7 jours au minimum, (SPe)

Max. 2 traitements avec cette matière active. (SPe)

Traitements à des intervalles de 7 à 14 jours. Max. 2 traitements avec cette matière active. (SPe) Seulement avec autorisation spéciale.

Ne pas appliquer par temps froid. Seulement sur jeunes stades larvaire.

Application répétée.

Application à intervalles de 7-10 jours.

Application à intervalles de 7-10 jours.

Dès stade 4-6 feuilles, épinards de printemps et d'automne.

Engrais foliaire compatible avec les plantes.

Pour favoriser le démarrage.

Pidel

Extrait d'algues avec soufre pour la fertilisation foliaire.

