Cultures maraîchères



DA = Délai d'attente en jours

Asperges

Ajouter Silwet L-77 à 0,1 l/ha à chaque application pour les volumes de bouillies réduits (100-150 l/ha) améliore la distribution de la matière active.

Graminées annuelles, repousses de céréales, chiendent	Agil	0,75 - 2,5 l/ha		Après la période de coupe.
Dicotylédones et monocotylédones annuelles	Caravel	0,25 l/ha		Plantation en production: Après la période de récolte. Avant que les turions ne pointent.
Dicotylédones et monocotylédones annuelles	Caravel	0,25 l/ha		Jeunes plantations: pendant l'année de plantation. Avant que les turions ne pointent.
Herbicide dans les plantations récentes	Condoral SC	0,75 l/ha		Avant et après la récolte. (SPe)
Dicotylédones	Lentagran	2 kg/ha		Après la période de coupe.
Grillure estivale (stemphyliose), rouille de l'asperge	Bogard	0,5 l/ha		En été. Max. 4 traitements par année. (SPe)
Brûlure des feuilles de l'asperge, rouille de l'asperge	Diagonal	1 l/ha		Dans jeunes plantations ou plantations en production après la récolte. Max. 3 traitements.
Pourriture grise	Switch	0,1 kg/ha		Après la récolte. Max. 3 traitements.
Criocère de l'asperge, criocère à douze points de l'asperge	Gepard	0,25 kg/ha		Après la récolte. Max. 2 traitements.
Criocère de l'asperge, criocère à douze points de l'asperge, thrips	Audienz	0,2 l/ha		Après la récolte. Max. 3 traitements.
Pucerons, mouches blanches	Piretro verde 🖑	2,5 l/ha	3	Max. 4 traitements par culture et année avec un intervale d'au moins de 7 jours. (SPe)
Pucerons	Pirimor	0,5 kg/ha		Seulement après récolte. Max. 2 traitements.
Pucerons de feuillage, criocère à douze points	Toohno 10 CS	0.1 l/bo		Après la récolte. Max. 2 traitements avec cette ma-

Noctuelles

thrips, mouches mineuses

de l'asperge, noctuelles terricoles ou vers gris,

Limaces

Gepard	0,25 kg/ha
Audienz	0,2 l/ha
Piretro verde 🖑	2,5 l/ha
Pirimor	0,5 kg/ha
Techno 10 CS	0,1 l/ha
XenTari 🖗 🖼	1 kg/ha
Amilon 5	5-7 kg/ha

Après la récolte. Max. 2 traitements avec cette matière active. Seulement avec autorisation spéciale.

Ne pas appliquer par temps froid. Seulement sur jeûnes stades larvaire.

Epandre après la levée.

Hi-Grow pour des légumes sains et croquantes

