

Céleri-branche, céleri-pomme, céleri-pomme pour bouillon

Da = Délai d'attente en jours

	Céleri-pomme	Céleri-branche			
	●	●	Ajouter Silwet L-77 à 0,1 l/ha à chaque application pour les volumes de bouillies réduits (100-150 l/ha) améliore la distribution de la matière active.		
Graminées annuelles, repousses de céréales, chiendent	●	●	Agil 1 - 2,5 l/ha	90	2-2,5 l/ha contre chiendent.
Dicotylédones annuelles monocotylédones annuelles	●	●	Caravel 0,25 l/ha		Immédiatement après la plantation.
Dicotylédones annuelles monocotylédones annuelles	●	●	Laguna 2 l/ha		Application env. 7 jours après la plantation. Après la croissance de la culture. (SPe)
Herbicide avant la plantation	●	●	Pendi 3 l/ha		Seulement possible, si on plante avec une machine à socs .
Maladie des taches	●	●	Bogard 0,5 l/ha	14	Max. 3 traitements par parcelle et année. (SPe)
Maladie des taches	●	●	Diagonal 1 l/ha	14	Max. 3 traitements par culture.
Maladie des taches	●	●	Sambesi Pro 4 l/ha		Miscible avec autres fongicides.
Maladie des taches	●	●	Quiz Pro 0,5 l/ha		Miscible avec autres fongicides.
Septoriose du céleri	●	●	Bouillie Bordelaise LG 6,5-9 kg/ha		En mélange.
Maladie des taches	●	●	Flowbrix 4,5-7 l/ha	21	1 ^{er} traitement dès la première attaque, traitements à 7-10 jours d'intervalle. Produit cuprique de haute qualité.
Maladie des taches	●	●	Cuproxtat liquide 13-18 l/ha	21	Dans un mélange en réservoir avec des fongicides organiques, la moitié de la concentration indiquée est suffisante.
Maladie des taches	●	●	Flint 0,4 kg/ha	14	Max. 3 traitements avec la même groupe de matière active.
			Flint 0,4 kg/ha	7	
Chenilles défoliatrices, noctuelles terricoles ou vers gris, noctuelles, mouches mineuses, thrips	●	●	Audienz 0,2 l/ha	7	Max. 3 traitements par culture à l'intervalle au moins de 7 jours. (SPe)
Pucerons, Mouches blanches	●	●	Piretro verde 2,5 l/ha	3	Max. 4 traitements par culture et année à l'intervalle de 7 jours. (SPe)
Pucerons	●	●	Pirimor 0,5 kg/ha	7	(SPe)
Pucerons	●	●	Gepard 0,25 kg/ha	14	
Pucerons, thrips	●	●	Siltac plus 0,15 %		2-3 traitements à des intervalles de 7 à 10 jours.
Pucerons, noctuelles terricoles, thrips, mouches mineuses, psylle de la carotte	●	●	Techno 10 CS 0,1 l/ha	14	Traitements à des intervalle de 7 à 14 jours. Max. 2 traitements avec cette substance active. (SPe). Seulement avec autorisation spéciale.
Mouche de la carotte	●	●	Techno 10 CS 0,1 l/ha	14	Traitements à des intervalle de 8 à 12 jours pendant le vol. (SPe)
Noctuelles	●	●	XenTari 1 kg/ha	3	Ne pas appliquer par temps froid. Seulement sur jeunes stades larvaire.
Kastanienholzextrakt	●	●	Dexa Pro 3 l/ha		
Fertilisation	●	●	Azofix plus 1,5 l/ha		Pour augmenter la disponibilité de l'azote.
Fertilisation	●	●	Fosfix plus 1,5 l/ha		Pour augmenter la disponibilité de phosphore.
Anti-carentiel Ca spécialement céleri de garde	●	●	Tip / Calcium 5 l/ha		Fin été et automne.
Stimulateur de croissance	●	●	Kickstart 0,15 l/ha		Pour favoriser le démarrage.
Gestion du stress	●	●	Penergetic p cultures maraîchères 0,25 l/ha + Vital 1 l/ha		plusieurs fois