

			DA = Délai d'attente en jours
Poireau			
Herbicide après la plantation. Graminées, repousses céréales, chiendent Mauvaises herbes et graminées Mauvaises herbes et graminées Mauvaises herbes et graminées	Spark	2 kg/ha	28
	Lentagran	2 kg/ha	56
	Agil	1 - 2,5 l/ha	
	Pendi	2-4 l/ha	
	Pendi	4-5 l/ha	
	Laguna Split	2x 0,5 l/ha	
Cladosporiose, rouille, taches pourpres. Alternaria spp. Phytophthora spp. Alternarioses, cladosporiose des oignons, phytophthora du poireau, rouille du poireau. Mildiou véritable Alternaria Maladies des feuilles	Bogard	0,5 l/ha	21
	Diagonal	1 l/ha	14
	Flint	0,4 kg/ha	14
	Carbyc Pro	1% 4 kg/ha	1
	Sambesi Pro	4 l/ha	
	Quiz Pro	1,5 l/ha	
Puceron Acariens	Vista	2%	
Thripse	Ortiga Pro	3 l/ha	
Thripse	Gepard	0,5 kg/ha	14
Mouches mineuses, noctuelles terricoles ou vers gris, pucerons du feuillages, teigne du poireau, thrips.	Techno 10 CS	0,1 l/ha	14
Teigne du poireau	XenTari	1 kg/ha	7
Contre les insectes suceurs	Siltac plus	0,15 %	
Teigne du poireau	Audienz	0,2 l/ha	7
Mouches mineuses, thrips	Audienz	0,4 l/ha	7
Pucerons, mouches blanches	Piretro verde	2,5 l/ha	3
Extrait de châtaignier	Dexa Pro	3 l/ha	
Solution de sulfate de magnésium	Olimag	3 l/ha	
Extrait d'algues avec soufre	Pidel	1% 4 l/ha	
Amélioration de la croissance	Azofix plus	1,5 l/ha	
Amélioration de la croissance	Fosfix plus	1,5 l/ha	
Amélioration de la croissance	Kickstar	0,15 l/ha	

Max. 1 traitement par culture. (SPe)
A partir du stade 3-feuilles.
2-2,5 l/ha contre chiendent.
Poireau semé. En prélevée.
Poireau planté. Avant la plantation.
Après la plantation. A partir du stade BBCH.

Max. 3 traitements par année. (SPe)
Max. 3 traitements par année. (SPe)
Max. 2 traitements, au stade 41-49 (BBCH).
Application répétée.
Application répétée.
Application répétée.

Bien mouiller les plantes de tous côtés.
Application répétée.
Max. 2 traitements par culture par année.
Traitements à des intervalle de 7 à 14 jours.
Max. 3 traitements avec cette matière active. (SPe) seulement avec autorisation spéciale.
La bouillie de pulvérisation doit sécher rapidement.
Max. 3 traitements par culture. (SPe)
Max. 4 traitements par parcelle/année/culture. (SPe)
Max. 4 traitements par culture et année.
Traitements à l'intervalle de 7 jours. (SPe)

Application répétée.
Pour augmenter la disponibilité de phosphore.
Pour augmenter la disponibilité de l'azote.
Pour augmenter la disponibilité de phosphore.
Application répétée.

Carbyc



Fongicide naturel dans les cultures maraîchères, l'arboriculture, la viticulture et les plantes ornementales



Céréales
Maïs
Tableau d'efficacité des herbicides
Pommes de terre
Colza
Grandes cultures divers
Soja/Tournesols/Pois
Conservation de fourrage
Viticulture
Fruits à pépins / Fruits à noyau
Baies / Cultures maraîchères /
Plantes ornementales
Insectes auxiliaires