

DA = Délai d'attente en jours

Radis, Radis longs, Raifort, Navets

	Radis	Radis longs	Raifort	Navets		
Dicotylédones et monocotylédones annuelles				●	Caravel 0,25 l/ha	Prélevée, dans les 3 jours après le semis. Spécialement pour culture d'été en plein air. (SPe)
Herbicide après le semis	●	●			Rapsan 500 SC 1 l/ha	
Mildiou, rouille blanche (effet part.)	●				Bion 30-60 g/ha	7 Max. 1 traitement par culture.
maladie des taches noires du chou				●	Diagonal 1 l/ha	14 Max. 3 traitements par culture.
maladie des taches noires du chou, mildiou, rouille	●	●	●		Diagonal 1 l/ha	14 Max. 2 traitements par culture.
Maladie de feuilles	●	●	●	●	Flowbrix 2,6 l/ha	14 Max. 3 traitements par culture.
Rouille blanche			●		Mildicut 4 l/ha	14 Max. 4 traitements, à partir du début de la croissance de la racine.
Mildiou			●		Revus 0,6 l/ha	14 Max. 2 traitements, au stade 12-49 (BBCH) (SPe)
Mildiou	●	●			Revus 0,6 l/ha	14 Max. 6 traitements par an et par parcelle au stade 12-49 (BBCH) (SPe)
Oïdium	●	●	●	●	Carbyc Pro 1% 4 kg/ha	1 Applications répétées.
Alternaria	●	●	●	●	Sambesi Pro 4 l/ha	Applications répétées.
Maladies des feuilles	●	●	●	●	Quiz Pro 1,5 l/ha	Applications répétées.
Pucerons Acariens	●	●	●	●	Vista 2 %	Bien mouiller les plantes de tous côtés.
Thrips	●	●	●	●	Ortiga Pro 3 l/ha	Applications répétées.
Chenilles noctuelles (défoliatrices) noctuelles, terricoles, mouche du chou, thrips	●			●	Audienz 0,2 l/ha	7 Max. 2 traitements par culture à intervalle de 7 jours. (SPe)
Pucerons, mouches blanches	●	●	●	●	Piretro verde 2,5 l/ha	3 Max. 4 traitements par culture et année. Traitement avec un intervalle de 7 jours. (SPe)
Pucerons	●	●	●	●	Pirimor 0,5 kg/ha	7 Max. 2 traitements par culture.
Insectes suceurs	●	●	●	●	Siltac plus 0,1-0,15 %	La bouillie de pulvérisation doit sécher rapidement.
Pucerons, altises, noctuelles terricoles ou vers gris, thrips, mouches mineuses, pucerons	●	●	●	●	Techno 10 CS 0,1 l/ha	14 Traitements à intervalles de 7 à 14 jours. Max. 2 traitements avec cette matière active (SPe) seulement avec autorisation spéciale.
Pucerons, acariens tétranyques	●	●	●	●	Vista 2 %	7 Veiller à bien mouiller les plantes.
Noctuelles	●	●		●	XenTari 1 kg/ha	3 Ne pas appliquer par temps froid. Seulement sur jeunes stades larvaire.
Limaces	●	●	●	●	Amilon 5 5-7 kg/ha	7 Epandre à partir du stade cotylédons.
Campagnols terrestre, taupes	●	●	●	●	Campa 1-5 cartouches/colonie	Bien refermer les galeries.
Extrait de châtaignier	●	●	●	●	Dexa Pro 3 l/ha	Applications répétées. Application à intervalles de 7 à 10 jours. Application à intervalles de 7 à 10 jours. Applications répétées.
Solution au sulfate de magnésium	●	●	●	●	Olimag 3 l/ha	
Extrait d'algues avec soufre	●	●	●	●	Pidel 1% 4 l/ha	
Engrais	●	●	●	●	Miligard 1% 4-5 kg/ha	
Stimulation de la croissance	●	●	●	●	Kickstart 0,15 l/ha	