Cultures maraîchères

Leu+Gygax SA

DA = Délai d'attente en jours

Oignons / Echalottes et Ail

Ajouter Silwet L-77 à 0,1 l/ha à chaque application pour les volumes de bouillies réduits (100-150 l/ha) améliore la distribution de la matière active.

	Oignon (condiment)	Oignon potager	Ciboulette	Echalottes	Ail				
	●	●	●			**Pendi**	2-3 l/ha		Avant la levée des mauvaises herbes. Diminuer la dose sur sols légers. Profondeur de semis à 3 cm, post-levée à partir du stade 3-feuilles.
Contre dicotylédones	●	●	●	●	●	**Lentagran**	2 kg/ha	28	Post-levée à partir du stade 3-feuilles.
Contre graminées annuelles et chiendent	●	●	●	●	●	**Agil**	1 - 2,5 l/ha	56	2-2,5 l/ha contre chiendent.
Contre dicotylédones et graminées annuelles	●	●	●	●	●	**Laguna**	3 l/ha		Pré-levée. Seulement sur bulbes plantés. **(SPe)**
Cladosporiose, rouille, taches pourpres	●	●	●	●	●	**Bogard** TEAM BF	0,5 l/ha	14	Max. 3 traitements par année. **(SPe)**
Oïdium	●	●	●	●	●	**Carbyc Pro** BIO	0,3-1% 2,5-5 kg/ha	1	Traitement à l'intérvalle de 10 jours.
Mildiou	●	●	●	●	●	**Diagonal**	1 l/ha	1	Traitement à l'intérvalle de 10 jours.
Botrytis	●	●	●			**Switch**	1 kg/ha	14	Max. 2 traitements par année. **(SPe)**
Pourriture blanche des Allium	●	●	●			**Switch**	1 kg/ha		1ère traitement au stade 2 feuilles 2ème traitement 3 semaines plus tard (semis d'automne traiter au printemps). **(SPe)**
Thrips				●	●	**Audienz** BIO	0,2 l/ha	7	Max. 3 traitements par culture/année.
Mouches mineuses, thrips	●	●	●			**Audienz** BIO	0,4 l/ha	7	Max. 4 traitements par parcelle et année dans cette culture. **(PSe)**
Pucerons, mouches blanches	●	●	●	●	●	**Piretro verde** BIO	2,5 l/ha	3	Max. 3 traitements par culture. Traitements à des intervalles de 7 à 14 jours. **(PSe)**
Pucerons	●	●		●		**Pirimor**	0,5 kg/ha	7	Pas d'homologation sur ciboulette. **(SPe)**
Pucerons du feuillage, noctuelles en terricoles, teigne de poireau, mouches mineuses, thrips.	●	●	●	●	●	**Techno 10 CS**	0,1 l/ha	14	Max. 3 traitements par culture. Traitements à des intervalles de 7 à 14 jours. **(PSe)** seulement avec autorisation spéciale.
Contre les insectes suceurs.	●	●	●	●	●	**Siltac plus** TEAM BF	0,15 %		Max. 3 traitements par culture. Traitements à des intervalles de 7 à 14 jours.
Noctuelles			●	●	●	**XenTari** BIO TEAM BF	1 kg/ha		Ne pas appliquer par temps froid. Seulement sur jeûnes stades larvaire **(SPe)**
Limaces	●	●	●	●	●	**Amilon 5**	7 kg/ha		Epandre sur le sol, Ne pas saupoudrer les parties comestibles des plantes.
Anti-germinatif	●	●		●	●	**Fazor**	3,5-4 kg/ha		20-30 % des tiges couchées. Pour les détails voir page 65 information sur Fazor.
	●	●	●	●	●	**Dexa Pro** BIO TEAM BF	4 l/ha		Ajouter à la bouillie.
	●	●	●	●	●	**Fetrilon-Combi** [1]	1 kg/ha		Ajouter à la bouillie.
Vitalité et gestion du stress	●	●	●	●	●	**Polygrün** BIO TEAM BF	1 l/ha		2-3 traitements dès le stade BBCH 14.
	●	●	●	●	●	**+ Vital** BIO TEAM BF	1 l/ha		
	●	●	●	●	●	**+ Penergetic p** cultures maraîchères BIO TEAM BF	0,1 kg/ha		
	●	●	●	●	●	**Azofix plus et Foxfix plus** TEAM BF BIO	1 l/ha		Pour augmenter la disponibilité de l'azote et du phosphore.