

Getreidebau

Unkrautbekämpfung



Gräser Unkräuter Wurzelunkräuter	Unkrautentwicklung												Kulturarten								Hinweise	
	Vorauflauf	10 Früher Nachauflauf	D 11 1-Blatt- Stadium	D 13 3-Blatt- Stadium	E 21 Beginn Bestockung	F 25 Haupt- bestockung	G 29 Ende Bestockung	H 30 Beginn Schossen	I 31 1-Knoten- Stadium	32 2-Knoten- Stadium	K 37 Fahnenblatt spitzt	39 Fahnenblatt voll entwickelt	Weichweizen	Hartweizen	Korn / Dinkel	Emmer	Triticale	Gerste	Roggen	Hafer		
Herbizidstrategie im Herbst																						
Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.																						
Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Einjähr. Rispengras, Klebern, Kamille, Taubnessel, Hühnerdarm usw.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Mischbar mit Azofix plus zur N-Versorgung. Mischbar mit Fosfix Plus zur P-Versorgung. Wintergerste, Winterweizen, Triticale und Roggen (unter ungünstigen Bedingungen bei Hybridroggen Wuchsbeeinträchtigungen mit Miranda möglich), Hybridroggen Sätiefe mind. 3 cm. Nur bei gut gedecktem Saatgut anwenden. (GWS)
Ackerfuchsschwanz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	(GWS) Tolit ist auch mischbar mit Pendi.
Windhalm, Rispengräser, Kamillen, Vogelmiere, Ackerfuchsschwanz, Raygras, Kornblume u.a.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Herbizidstrategien im Frühjahr																						
Ackerdistel, Ackerfuchsschwanz, Ackersenf, Amarant, Ausfallraps, Ausfallsonnenblumen, Bingelkraut, Blacken, Bluthirse, Borstenhirse, Ehrenpreis, Erdrauch, Fingerhirse, Flohknöterich, Flughafer, Franzosenkraut, Gänsedistel, Gänsefuß, Hahnenfuß, Hederich, Hellerkraut, Hirtentäschel, Hohlzahn, Hühnerhirse, Hundspetersilie, Kamillen, Klatschmohn, Klebern, Kornblume, Kreuzkraut, Melde, Nachtschatten, Portulak, Raygras, Rispengras einj., Stiefmütterchen Taubnessel, Trespen, Vergissmeinnicht, Vogelknöterich, Vogelmiere, Winden, Windknöterich, Windhalm.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Raygras, Klebern, Kamille, Taubnessel, Blacken, Disteln u.a.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Bei Triticale und Roggen Zusatz von Level 2. (GWS)
Frühjahr Nachauflauf mit Gräserwirkung																						
Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Flughafer, Raygras, Rispengras	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Gegen Ackerfuchsschwanz 1,2 l/ha. (GWS)
Windhalm, Quecke, Rispengräser, Trespen und breitblättrige Unkräuter wie Klebern, Vogelmiere, Kamille, Senf, Hirtentäschel, Ausfallraps, Hellerkraut, Stiefmütterchen, Vergissmeinnicht.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	(GWS)
Quecke, Windhalm, Trespe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Behandlung speziell gegen Quecke (20 cm hoch). (GWS)
Frühjahr Nachauflauf ohne Gräserwirkung																						
Klebern, Winden, Hirtentäschel, Hühnerdarm, Senf	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Speziell bei Klebern als Nachbehandlung.
Ehrenpreis, Stiefmütterchen, Taubnesseln	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ausfallraps, Blacken, Disteln, Ehrenpreis, Hundspetersilie, Kamille, Klebern, Stiefmütterchen, Taubnesseln, Vogelmiere, Winde.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	(GWS)
Mischverunkrautung Senf, Klebern, Hühnerdarm, Winden, Disteln, Mohn.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Mischbar mit Stabilan plus.

Getreide
Mais
Herbizid-Wirkungstabelle
Kartoffeln
Rüben
Raps
Soja / Erbsen / Sonnenblumen
Feidbau div.
Futterkonservierung
Weinbau
Kernobst/Steinobst
Gemüse / Beeren
Zierpflanzenbau
Nützlinge