

Kartoffeln

Vorauslauf, Keimung

Auflaufen

Blatt- u. Stengelwachstum
09 10-19

Längenwachstum
21-29

Staudenschluss
31-39

Knospenbildung
51

Blüte
60-69

Blüte/Beerenbildung
70-79

Vergilbung/Abreife
91-97



Hinweise

Unkrautbekämpfung

Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.

In Kartoffeln unter Folien gegen einjährige Unkräuter und Ungräser

Pendi 3 l/ha + Condoral SC 0,5 l/ha

Die Mischung Pendi und Condoral SC ist auch in Pflanzkartoffeln möglich. (GWS)

Einjährige Unkräuter und Ungräser in Speise- und Futterkartoffeln

Oxidia 4-5 l/ha + Condoral SC 0,5 l/ha + Azofix plus und Fosfix plus je 1-2 l/ha

Vor- oder früher Nachauflauf. (GWS)

Oxidia 2 l/ha + Laguna 2 l/ha + Condoral SC 0,5 l/ha + Azofix plus und Fosfix plus je 1-2 l/ha

Mischung nur im Vorauslauf anwenden! (GWS)

Einjährige Unkräuter und Ungräser

Soletto 3-4 l/ha

Nur im Vorauslauf anwenden

Klebern, Unkräuter inkl. Einjährige Gräser, Hirse, Quecke, Amarant

Rimuron 40 g/ha + Codacide 2 l/ha

Bei Splitbehandlung 2 x 20 g/ha + Codacide 1 l/ha (GWS)

Einjährige Unkräuter und Ungräser in Speise- und Futterkartoffeln

Condoral SC 0,5-0,75 l/ha

Condoral SC 0,3 - 0,6 l/ha im NA

Sorteneinschränkungen beachten: Behandlung nur im Vorauslauf mit max. 750 ml Condoral: Agata, Innovator, Lady Christl, Lady Félicia, Lady Rosetta und Marlen. (GWS)

Einjährige Unkräuter und Ungräser in Kartoffeln zur Pflanzgutproduktion

Condoral SC 0,5-0,75 l/ha

Behandlung nur im Vorauslauf mit max. 750 ml Condoral und notfalls im frühen Nachauflauf bis 5 cm Staudenhöhe mit max. 400 ml Condoral: Agria, Charlotte, Hermes, Lady Claire, Ostara, Nicola und Victoria.

Einjährige Unkräuter (spez. Klebern und Zyperngras) auch als Unterblatt-Spritzung möglich

Effican SG 0,5 - 1,1 kg/ha

Ergänzungsbehandlung gegen **Klebern/Zyperngras**. Nur abgetrocknete Bestände und bei wüchsiger Witterung behandeln. Wuchshöhe der Kartoffelstauden 10 - 20 cm hoch. (GWS)

Einjährige Ungräser und Quecke inkl. Raygräser, Hirse u.a. Unterblattbehandlung gegen Unkräuter (inkl. Winden)

Agil 1 - 2,5 l/ha

Condoral SC 0,5 l/ha + MCPB LG 3 l/ha + Effican SG 1 kg/ha

Quecken von ca. 20 cm mit Agil 1,75 - 2,5 l/ha behandeln. Mischbar mit unseren Fungiziden.

Nicht über Stauden spritzen. (GWS)

Fungizidstrategie mit 8 Behandlungen

3 x Proxanil 2,5 l/ha + Flint 0,15 kg/ha + Kickstart 0,15 l/ha
3 x Ibiza SC 0,4 l/ha + Cymbal WG 0,25 kg/ha + Kickstart 0,15 l/ha
2 x Ranman Top 0,5 l/ha

Eine Zugabe von Bogard 0,5 l/ha verbessert die Wirkung gegen Alternaria. (GWS)

Abstoppen von Krautfäulebefall bei feuchter Witterung Nach Behandlung, 24 Std. kein Niederschlag

Proxanil 2,5 l/ha + Ranman Top 0,5 l/ha
Cymbal 0,25 kg/ha + Ranman Top 0,5 l/ha

Eventuell Behandlung nach 3 Tagen wiederholen. (GWS)
Eventuell Behandlung nach 3 Tagen wiederholen. (GWS)

Keimhemmung

Speise- und Industriekartoffeln

Fazor 5 kg/ha

Bei wüchsiger Witterung ab 25 mm Knollendurchmesser. Detaillierte Hinweise: Siehe Infoseite Fazor S. 65. **Wirkung auf Durchwuchskartoffeln im Folgejahr.**

Krankheiten

Saatgutbeizung

Sambesi Pro 2 l/ha (1%)

Rhizoctonia, Silberschorf

Kraut- und Knollenfäule / Alternaria

Ranman Top 0,5 l/ha + Bogard 015 l/ha oder Flint 0,15 kg/ha

Hohe Regenfestigkeit und gute Sporenwirkung. Max. 3 Behandlungen. **Ranman nicht mit Silwet L-77 mischen.** (GWS)

Pflanzkartoffeln

3 x Aviso 2 kg/ha + Revus 0,6 l/ha
3 x Ranman Top 0,5 l/ha
Flowbrix 1,5 l/ha + Dexa Pro 4 l/ha

Maximal 3 Behandlungen mit Ranman Top. (GWS)

Max. 4 kg Kupfer-Metall/ha/Jahr

Schädlinge

Schnecken

Amilon 5 5-7 kg/ha

Kartoffelkäfer, Blattläuse

Gepard 0,1 kg/ha - 0,2 kg/ha
Audienc 0,05 l/ha
Coragen 60 ml/ha
Oikos 1,5 l/ha

Maximal 1 Behandlung pro Parzelle und Jahr.
Maximal 2 Behandlungen pro Kultur und Jahr.
Systemisches Insektizid, wirkt auf alle Stadien des Kartoffelkäfers: Eier + Adulte + Larven. Nur mit Sonderbewilligung.
Maximal 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr. (GWS)

Kartoffelkäfer [L1 und L2]

Novodor 3 FC 3 - 5 l/ha

Nur gegen junge Larvenstadien.

Virusübertragende Blattläuse in Pflanzkartoffeln

Spray-Oil 7-E 7 l/ha in 350 l Wasser oder Winsum 2-3% (10-15 l/ha in 500 l Wasser)
Pirimor 150 g/ha oder Techno 10 CS 0,075 l/ha

1 mal pro Woche, sobald 30 % der Pflanzen aufgelaufen sind.
Unter Tunnelabdeckung oder im Gewächshaus. Nur mit Sonderbewilligung.

Biostimulatoren

Saatgutbeizung

Penergetic p Feldbau 250 g/ha

Saatgutbehandlung auf der Pflanzmaschine beim Legen der Knollen.
Penergetic ist mit Cu mischbar.

Stressbewältigung

Penergetic b Boden 400 g/ha + Terrasan 1,5-5 l/ha

Amino Power Plus liquid 1-2 l/ha

Zusätzliche Wuchsförderung.

Polygrün 0,5-1 l/ha 2-3 Behandlungen

Penergetic p Feldbau 100 g/ha + Vital 1 l/ha alle 7-10 Tage

nach der Ernte **Penergetic b Boden 400 g/ha** Als Zusatz zu Fungiziden.

Blattdüngung

Manganmangel

MaxMan 400 1 l/ha

Mischbar mit Flowbrix.

Spurenelementmangel Mg, Mn, B, u.a. und Stärkeaufbau

Fetrilon-Combi 1 kg/ha

Moorböden, 2 - 3x spritzen. Mischbar mit unseren Fungiziden.

Wachstumsförderung

Folifert supermix 4,1 kg/ha oder Final K 3 l/ha (ab Reihenschluss)

Den Fungizidspritzungen zur Förderung einer gesunden Staudenentwicklung zusetzen. Flüssigdünger LG wirkt pH-senkend.