











Gemüsebau

Buschbohnen

WF = Wartezeit in Tagen

Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.

Einjährige Ungräser	Agil	1 l/ha	28	<p>Nachauflauf mischbar mit Effican SG. Splitbehandlung mit 2 x 0,5 l/ha möglich.</p> <p>Im Keimblatt der Unkräuter. Splitbehandlung: nicht bei Hitze und nur auf abgetrocknete Bestände spritzen. (GWS)</p> <p>Vorauflauf</p> <p>Vorauflauf unmittelbar bis 2 Tage nach der Saat.</p>
Vorauflauf und Nachauflauf Unkräuter und Ungräser (speziell Amaranth und Nachtschatten)	Bolero	1 l/ha		
Einjährige Unkräuter	Effican SG	2 x 0,4 kg/ha		
Einjährige Gräser und Unkräuter	Frontier X2	1,2-1,4 l/ha		
Einjährige Gräser und Unkräuter	Caravel + Frontier X2	0,25 l/ha 0,9 l/ha		
Bohnenrost, Brennflecken	Flint	0,04 % 400 g/ha	3	Bei Befallsbeginn. BBCH 13-79. Im Gewächshaus.
Bohnenbrand, Fettfleckenkrankheit	Flowbrix 	2 l/ha	21	1. Behandlung bei Befallsbeginn, regelmäßige Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.
	Kupfer Bordo LG 	4 kg/ha	21	
	Cuproxtat flüssig 	4 l/ha	21	
	Switch	0,5-0,8 kg/ha	14	
Braunfleckenkrankheit, Brennfleckenkrankheit, Falscher Mehltau, Sclerotinia-Fäule	Diagonal	1 l/ha	14	Max. 3 Behandlungen pro Kultur.
Blattläuse	Pirimor	0,5 kg/ha	7	Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen. Maximal 2 Behandlungen mit diesem Wirkstoff. (GWS)
Blattläuse, Erdraupen, Minierfliegen, Erbsenblattrandkäfer, Thripse	Techno 10 CS	0,1 l/ha	7	Mit Sonderbewilligung. (GWS)
	XenTari  	1 kg/ha	3	
Eulenraupen				
Blattläuse, Thripse	Siltac plus 	0,1 l/ha		Auf gute Benetzung achten.
Blattläuse, Weiße Fliegen	Piretro Verde 	2,5 l/ha	3	(GWS)
Weisse Fliegen	Vista  	20 l/ha		
Wachstumsförderung	HBR 	1 l/ha		Bei frühen Kulturen gegen Kältestress.