

# Fenchel

Einjährige Gräser und Unkräuter	<b>Laguna</b>	2 l/ha	90 70	gesät gepflanzt
Unkräuter, Ungräser	<b>Pendi</b>	2-4 l/ha		Unmittelbar nach der Saat oder vor der Pflanzung. Leichte Böden untere Dosierung.
Einjährige Ungräser	<b>Agil</b>	1 l/ha	28	
Einjährige Gräser und Unkräuter	<b>Caravel</b>	0,25 l/ha	60	gesät: Voraufbau bis 2 Tage nach Saat. gepflanzt: unmittelbar nach Pflanzung
Cercospora und Ramularia, Blattfleckenkrankheit	<b>Bogard</b>	0,5 l/ha	14	Ab Befallsbeginn. Max. 3 Behandlungen pro Parzelle/Jahr. (GWS)
Cercospora und Ramularia, Blattfleckenkrankheit, Falscher Mehltau der Doldenblütler	<b>Diagonal</b>	1 l/ha	7	Max. 3 Behandlungen pro Kultur.
Falscher Mehltau der Doldenblütler	<b>Revus + Quiz Pro</b>  	0,6 l/ha 1 l/ha	14	Max. 3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.
Blattläuse, Erdraupen, Minierfliegen, Möhrenblattfloh, Möhrenfliegen, Thripse	<b>Techno 10 CS</b>	0,1 l/ha	14	Mit Sonderbewilligung. (GWS)
Blattläuse, Thripse	<b>Siltac plus</b> 	0,1 l/ha		Auf gute Benetzung achten.
Blattfressende Raupen, Erdraupen, Eulenraupen (blattfressend), Minierfliegen, Thripse	<b>Audienz</b> 	0,2 l/ha	7	3 Behandlungen pro Kultur im Abstand von mind. 7 Tagen.
Blattläuse, Weiße Fliegen	<b>Piretro verde</b> 	2,5 l/ha	3	Max. 4 Behandlungen im Abstand von mind. 7 Tagen.
Eulenraupen (blattfressend)	<b>XenTari</b>  	1 kg/ha	3	Nicht bei kaltem Wetter einsetzen. Nur gegen junge Larvenstadien.
Wachstumsförderung	<b>HBR</b> 	1 l/ha		Bei frühen Kulturen gegen Kältestress.
Bormangel	<b>Micro Bor</b>  	1-3 l/ha		Bei Bedarf wiederholen.
Calcium- und Spurenelementmangel	<b>Basfoliar Combi STIPP</b> 	3 l/ha		2 - 3 mal.