

Gurken- und Kürbisgewächse

	Gurken, Essiggurken, Cornichon					Wasser melonen		Melonen		Ölkürbisse		Kürbisse mit geniessbarer Schale		Kürbisse mit ungeniessbarer Schale		WF = Warte frist in Tagen
Einjährige Ungräser und Unkräuter (Freiland)	●															Zwischenreihenbehandlung. Maximal 1 Behandlung pro Kultur.
Einjährige Ungräser und Unkräuter (Freiland)		●														Vorauflauf: unmittelbar nach der Saat/Pflanzung.
Gummistengelkrankheit [Didymella bryoniae]	●															3 Maximal 3 Behandlungen. (GWS)
Alternaria, Echter Mehltau, Krätze.																3 Maximal 3 Behandlungen. (GWS)
Falscher Mehltau	●															15 Maximal 3 Behandlungen pro Kultur.
Echter Mehltau	●	●	●	●	●	●										Anwendung: Stadium BBCH 12 bis 89.
Echter Mehltau	●	●	●	●	●	●										3 Temperatur beachten.
Echter Mehltau	●	●	●	●	●	●										3
Anthraknose, Krätze	●															3 Maximal 2 Behandlungen pro Kultur/Jahr.
Echter / Falscher Mehltau	●	●	●	●	●	●										21 Maximal 2 Behandlungen pro Kultur/Jahr.
Echter / Falscher Mehltau (Gewächshaus)	●															3 Maximal 2 Behandlungen pro Kultur/Jahr.
Echter Mehltau	●															3 Ab Befallsbeginn.
Gummistengelkrankheit	●	●	●	●	●	●										3 Maximal 3 Behandlungen.
Teilwirkung: Eckige Blattfleckenkrankheit, Falscher Mehltau, der Kürbisgewächse	●															21 1. Behandlung bei Befallsbeginn, regelmässige Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.
Graufäule (Gewächshaus)	●															21
Gummistengelkrankheit (Gewächshaus)	●															Max. 4 Behandlungen im Abstand von 3 Wochen.
Krankheiten durch pathogene Bodenpilze [Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.]	●															Behandlung im Abstand von 3-4 Wochen wiederholen.
Falscher Mehltau (Gewächshaus)	●	●	●	●	●	●										Giessen vor der Aussaat oder Pflanzung. Anzucht von Jungpflanzen und Saatbeet-Behandlung.
Botrytis, Sclerotinia	●															3 Maximal 3 Behandlungen.
Raupen, Thripse		●	●													3 Im Gewächshaus max. 3 Behandlungen.
Blattläuse, Thripse	●	●	●	●	●	●										3 Ölkürbis Warte frist: 14 Tage.
Blattläuse	●	●	●	●	●	●										2-3 Behandlungen im Abstand von etwa 7-10 Tagen.
Eulenraupen	●	●	●	●	●	●										7 Nützlingsschonend. (ohne Gurkenblattlaus).
Spinnmilben /(Eier, Larven)	●	●	●	●	●	●										3 Maximal 2 Behandlungen pro Jahr. (GWS)
Blattläuse, Spinnmilben	●	●	●	●	●	●										7 Anwendbar bis spätestens 11.07.2025. (GWS)
Blattläuse, Spinnmilben	●	●	●	●	●	●										7 Pflanzen allseitig gut benetzen.
Eulenraupen	●															Pflanzen allseitig gut benetzen.
Blattgesundheit	●	●	●	●	●	●										3 Behandlung im Abstand von 7-14 Tagen.
Magnesiumdünger	●	●	●	●	●	●										Anwendung: Stadium BBCH 12 - 89.
Stressmindernd bei ersten Blattläusen	●	●	●	●	●	●										Anwendung: bei ersten Blattlaussichtungen
Eisenmangel (z.B. hellgrüne Gurke im Treibhaus)	●	●	●	●	●	●										Vor der Pflanzung einfräsen oder nach der Pflanzung einarbeiten).