Karotten FiBL	Vor der Pflanzung	.)	PDCU 10 10	PROU 14	PDCU 10	BBCH 39-49	Leu+Gygax AG Hinweise
_		BBCH 0-10	BBCH 10-12	BBCH 14	BBCH 19	BBCH 39-49	
Krankheiten							WF in Tagen
Alternaria-Möhrenschwärze			Flowbrix 0.45-0	.7 % 4.5-7 l/ha			1. Behandlung bei Befallsbeginn, regelmässige Behandlungen in
Alternaria-Möhrenschwärze			Flowbrix 1.5 l/ha + Sambesi Pro 4 l/ha				Abständen von 7-10 Tagen. Vorsicht wegen Phytotoxizität!
Alternaria-Möhrenschwärze			Quiz Pro 0,225 l				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Echter Mehltau			Carbyc Pro 1 %				1
Alternaria			Sambesi Pro 4-5	5 l/ha			
Schädlinge							
Blattläuse, Spinnmilben			Vista 2 %				
Blattläuse, Weisse Fliegen		Piretro verde 2.5 l/ha					Max. 4 Behandlungen pro Kultur und Jahr.
Blattläuse		Ortiga Pro 7 l/ha					Verbessert die Pflanzenaktivität z.B. bei parasitären Angriffen, Klimastress.
Biostimulatoren							
Organischer Düngerlösung		Vital 1 l/ha + Penergetic p Gemüse 0.1 kg/ha + Polygrün 1.5 l/ha					
Organischer Düngerlösung				Fence N 1.5-3 l/	/ha		
Braunalgenextrakt		Noctudor 4 l/ha					
Braunalgen und		Pidel 4 I/ha					
Hefeextrakt							
Braunalgenextrakt	Harvel 10 l/ha						
Pflanzenextrakt		Hi-Grow 5 I/ha					
Düngungen							
Bor			Micro B	or 1-3 l/ha			Bei Bormangel. (Splittbehandlung)
Stickstoffbakterien	Azofix plus 1-2	2 l/ha					Bakterien die Luftsticktoff pflanzen- verfügbar machen.
Phosphorbakterien	Fosfix plus 1-2	2 I/ha					Bakterien die Phosphor pflanzenverfügbar machen.