Gemüsebau



WF = Wartefrist in Tagen

Zwiebeln / Schalotten und

Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.

Knoblauch						Wirkstoffverteilung.			
				Speisezwiebeln					
						Gemüsezwiebeln			
						Bundzwiebeln			
						Schalotten			
						Knoblauch			
	•	•	•			Pendi	2-3 l/ha		Vor dem Auflaufen der Unkräuter. In leichten Böden untere Dosierung.
									Saattiefe mindestens 3 cm.
O									
Gegen breitblättrige Unkräuter	•	•	•	•	•	Lentagran	2 kg/ha	28	Nachauflauf ab 3-Blattstadium.
Ungräser, Ausfallgetreide,	•	•	•	•	•	Agil	1 - 2,5 l/ha	56	2-2,5 l/ha gegen Quecke.
Quecke		Ū		Ū			72.2.		
Einj. Ungräser und Unkräuter	•	•	•	•	•	Laguna	3 l/ha		Vorauflauf. Nur gesteckte Kulturen. (GWS)
Durnurflooken Dootnilaa									
Purpurflecken, Rostpilze, Samtfleckenkrankheit	•	•	•	•	•	Bogard	0,5 l/ha	14	Maximal 3 Behandlungen pro Jahr. (GWS)
Echter Mehltau	•	•	•	•	•	Carbyc Pro 0,3	3-1 % 2,5-5 kg/l	na	Behandlung im Abstand von 10 Tagen.
						BO TEAM BF			
Falscher Mehltau	•	•	•	•	•	Diagonal	1 l/ha	14	Maximal 3 Behandlungen pro Kultur. (Gws)
Botrytis						Switch	1 kg/ha	1/	Maximal 2 Behandlungen pro Jahr. (GWS)
						SWITCH			
Mehlkrankheit	•	•	•			Switch	1 kg/ha		Maximal 2 Behandlungen pro Jahr.
									Behandlung im 2-Blattstadium Behandlung 3 Wochen später
									(bei Herbstsaat im Frühjahr). (gws)
Thripse						Audienz 🖑	0,2 l/ha	7	Max. 3 Behandlungen pro Kultur/Jahr.
ППрэс						Addienz	0,2 I/11a	′	· .
Minierfliegen, Thripse	•	•	•			Audienz 🖑	0,4 l/ha	7	Max. 4 Behandlungen pro Parzelle und Jahr in dieser Kultur. (GWS)
									Max. 4 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
Blattläuse, Weisse Fliegen	•	•	•	•	•	Piretro verde 🖑	2,5 l/ha	3	Behandlungen im Abstand von mind. 7 Tagen. (GWs)
Blattläuse	•	•		•		Pirimor	0,5 kg/ha	7	Keine Anwendung bei Bundzwiebeln. (GWS)
Blattläuse (Röhrenläuse,		Ĭ							Maximal 3 Behandlungen pro Kultur. Behand-
Erdraupen, Lauchmotten,	•	•	•	•	•	Techno 10 CS	0,1 l/ha	14	lungen im Abstand von 7-14 Tagen. (GWS)
Thripse									nur mit Sonderbewilligung.
Blattsaugende Insekten	•	•	•	•	•	Siltac plus	0,15 %		Maximal 3 Behandlungen pro Kultur. Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen.
Eulenraupen			•	•	•	XenTari [®] [™]	1 kg/ha		Nicht bei kaltem Wetter einsetzen. Nur gegen
_3.035011							g/ric		junge Larvenstadien.(GWS)
Schnecken	•	•	•	•	•	Amilon 5	7 kg/ha		Auf den Boden zu streuen. Keine essbaren Pflanzenteile bestreuen.
Keimhemmung	•	•		•	•	Fazor	3,5-4 kg/ha		20-30 % der Schäfte geknickt. Hinweis Seite 65.
Almon over 14 th Oct.						Pidel DEM BF	4 l/ha		Anwendung im Abstand von 7-10 Tagen.
Algenextrakt it Schwefel									
	•	•	•	•	•	Dexa Pro	4 l/ha		Der Spritzbrühe beifügen.
	•	•	•	•	•	Fetrilon-Combi ¹	1 kg/ha		Der Spritzbrühe beifügen.
Vitalität und klimatische	•	•	•	•	•	Polygrün 🖑 🚟	1 l/ha		2-3 Behandlungen. Ab Stadium BBCH 14.
Stressbewältigung						+			<u> </u>
		•				Vital W FEAR	1 l/ha		
	•	•	•	•	•	Penergetic p Gemüse	e ∰0,1 kg/ha 🔫	BF	
	•	•	•	•	•	Azofix plus u. Foxfix	plus 1 l/ha	8	Zur Erhöhung des Stickstoff und Phosphors
							TEAM BF		im Boden.