













<b>Féveroles</b>		avant le semis	Pré-levée	Cotylédons 2 feuilles 10-12	3-4 feuilles 13-14	Apparition boutons floraux 50-59	Formation des gousses 70-79	Notes
<b>Herbicides</b>		<b>Ajouter Silwet L-77 à 0,1 l/ha à chaque application pour les volumes de bouillies réduits (100-150 l/ha) améliore la distribution de la matière active.</b>						
Prélevée et postlevée. Adventices et graminées (spécialement amarantes et morelles noires).			<b>Bolero 1 l/ha</b>					En pré-levée. Miscible avec Frontier X2.
Mono et dicotylédones annuelles			<b>Frontier X2</b> + <b>Caravel</b> 0,25 l/ha 1,2 - 1,4 l/ha					
Mono et dicotylédones annuelles			<b>Laguna 3 l/ha</b>					<b>(SPe)</b>
Graminées annuelles, millets, ray-grass, repousses de céréales, chiendent.				<b>Agil 1 - 2,5 l/ha</b>				Application dès l'apparition de la première vraie feuille de la culture jusqu'à la formation des boutons floraux. Chiendents 2-2,5 l/ha.
<b>Ravageurs</b>								
	Limaces			<b>Amilon 5</b> 5-7 kg/ha				Ne pas utiliser plus de 700 g de substance active de métaldéhyde par hectare sur la même parcelle dans un délai d'un an.
	Noctuelles terricoles			<b>Techno 10 CS</b> 0,075 l/ha				Seulement avec autorisation spéciale. <b>(SPe)</b>
	Pucerons					<b>Pirimor</b> 0,15 kg/ha		Intervention après contrôles. Ménage les auxiliaires. <b>(SPe)</b>
Effarouchement				<b>Penergetic b VV</b> 0.7 kg/ha  				Miscible avec les herbicides.
				<b>Penergetic b WV</b> 0.6 kg/ha  				Réduit les dommages causés aux pâturages et aux cultures par les animaux sauvages.
<b>Engrais starter et booster</b>								
Pour des racines fortes dans les pois et le soja				<b>Polygrün</b> 1-5 l/ha  		<b>Polygrün Blüte</b> 1-2 l/ha 		
				<b>Level 2</b> 0,8 l/ha 				
				<b>Penergetic p grandes cultures</b> 100 g/ha  		<b>+ Vital</b> 1 l/ha  		1-2 traitements.