





<b>Lupins</b>	Semis BBCH 00-09	Développement des feuilles BBCH 10-39	Floraison BBCH 60-69	Développement de la cosse BBCH 70-80	<b>Notes</b>
<b>Herbicides</b>	<b>Ajouter Silwet L-77 à 0,1 l/ha à chaque application pour les volumes de bouillies réduits (100-150 l/ha) améliore la distribution de la matière active.</b>				
Gaillet, fumeterre, camomille, millets, renouée liseron	<b>Caravel</b> 0.3 l/ha				Pré-levée, immédiatement après le semis.
Vulpin de champs, chénopode, coquelicot, ortie royale, euphorbe	<b>Pendi</b> 2.5-4 l/ha				En pré-levée. Pas d'application sur les sols sableux.
<b>Maladies</b>					
Anthracnose du lupin		<b>Diagonal</b> 0.8 l/ha			Max. 2 traitements à 14 jours d'intervalle.
<b>Ravageurs</b>					
Limaces		<b>Amlon 5</b> 5 - 7 kg/ha			Ne pas utiliser plus de 700 g de substance active de métaldéhyde par hectare sur la même parcelle dans un délai d'un an.
Noctuelles		<b>Techno 10 CS</b> 0,075 l/ha			Max. 1 traitement par culture et année. <b>(SPe)</b> Seulement abec autorisation spéciale.
Effarouchement	<b>Penergetic b VV</b> 0.7 kg/ha  				
	<b>Penergetic b WV</b> 0.6 kg/ha  			Miscible avec les herbicides. Réduit les dégâts causés aux pâturages et aux cultures par les animaux sauvages.	