





Soja		avant le semis	Pré-levée	Cotylédons 2 feuilles 10-12	3-4 feuilles 13-14	Début floraison	Note
		Ajouter Silwet L-77 à 0,1 l/ha à chaque application pour les volumes de bouillies réduits (100-150 l/ha) améliore la distribution de la matière active.					
Herbicides							
Contre les dicotylédones et graminées annuelles, y compris millets			Frontier X2 1.2-1.4 l/ha + Caravel 0.25 l/ha				
Prélevée et postlevée. Dicotylédones et graminées (spécialement amarantes et morelle noire)			Bolero 1 l/ha	Bolero 1 l/ha + Effican SG 0,55-1,1 kg/ha			Traitements en splits 2 x 0,5 l/ha Bolero et 2 x 0,55 kg/ha Effican SG. (SPE)
Dicotylédones annuelles (spéc. gaillets et renouée persicaire), souchet				Effican SG 1.1 kg/ha			En plus du traitement de prélevée du stade germination à 4 feuilles. (SPE)
Graminées annuelles, millets, ray-grass, repousses de céréales, chiendents				Agil 1 - 2,5 l/ha			Application dès l'apparition de la première vraie feuille de la culture jusqu'à la formation des boutons floraux. Chiendents 2 - 2,5 l/ha.
Ravageurs							
	Limaces			Amilon 5 5 - 7 kg/ha			Ne pas utiliser plus de 700 g de substance active de métaldéhyde par hectare sur la même parcelle dans un délai d'un an.
	Noctuelles			Techno 10 CS 0,075 l/ha			Maximum 1 traitement par culture et année. (SPE) . Seulement avec autorisation spéciale.
Effarouchement			Penergetic b VV 0.7 kg/ha  				Miscible avec les herbicides.
			Penergetic b WV 0.6 kg/ha  				Réduit les dégâts causés aux pâturages et aux cultures par les animaux sauvages.