

Tabac	avant la plantation	plantation	2 - 5 feuilles 12-15	dès le stade 6 feuilles 16	Note
Herbicides	Ajouter Silwet L-77 à 0,1 l/ha à chaque application pour les volumes de bouillies réduits (100-150 l/ha) améliore la distribution de la matière active.				
Dicotylédones			Lentagran 1 kg/ha		2 - 4 semaines après la plantation.
Mono et dicotylédones annuelles	Galipan 2 l/ha				Avant ou immédiatement après la plantation.
Maladies					
Mildiou (mildiou du tabac)				Ranman Top 0,5 l/ha	Maximum 3 traitements par année.
				Revus 0,5 l/ha	Maximum 2 traitements par année.
Ravageurs					
Limaces				Amilon 5 5-7 kg/ha	Ne pas utiliser plus de 700 g de substance active de métaldéhyde par hectare sur la même parcelle dans un délai d'un an.
Chenilles				XenTari 1 kg/ha 	
Noctuelles				Techno 10 CS 0.075 %	Seulement avec autorisation spéciale. (SPe)
Pucerons				Gepard 0.25 kg/ha	Application: Avant la floraison. Dès le début de l'infestation.
Mouches blanches				Gepard 0.5 kg/ha	(SPe) Application: Avant la floraison. Dès le début de l'infestation.
Effarouchement			Penergetic b VV 0.7 kg/ha 		Miscible avec les herbicides.
			Penergetic b WV 0.6 kg/ha 		Réduit les dommages causés aux pâturages et aux cultures par les animaux sauvages.