



					Produit	Dosage	Remarques	
					Mûres	DA = Délai d'attente en jours		
				Framboises				
				Espèces de ribes				
				Grand sureau				
				Myrtille				
Mono et dicotylédones annuelles	●	●	●	●	Galipan	2,5 l/ha	21	Au printemps, avant le débourrement.
Mono et dicotylédones annuelles				●	Granat	2,5 l/ha	21	Sauf les baies de josta.
Graminées annuelles et chiendent	●	●	●		Agil	0,75-2,5 l/ha		Application: au stade 2-3 feuilles des mauvaises herbes.
Mono et dicotylédones	●				Glifonex TF	2-10 l/ha		Traitement plante par plante.
	●				Landmaster Supreme 480 TF	1,5-7,5 l/ha		
Liseron		●	●		MCPB LG	0,4 % 4 l/ha		Seulement les ribes.
Oïdium	●	●	●	●	Carbyc Pro	0,5-1%	1	Application Stade BBCH 12-89.
Oïdium				●	Diagonal	1 l/ha		Max. 3 traitements par parcelle et année.
Maladies des rameaux	●	●			Diagonal	1 l/ha		Max. 3 traitements par parcelle et année.
Maladies des rameaux	●	●			Cuproxat liquide	0,5-1,3 %		Application: avant la floraison après la récolte.
	●	●			Flowbrix	0,25-0,6 %		
Anthracnose		●	●	●	Cuproxat liquide	0,25-0,75 %	21	Application: aussitôt après la floraison et après la récolte.
		●	●	●	Flowbrix	0,15-0,4 %	21	
Rouille des framboisiers		●			Bogard	0,5 l/ha		Application: Max. 3 traitements par parcelle et année. Avant la floraison après la récolte. (SPe)
Oïdium				●	Bogard	0,5 l/ha		
Colletotrichum acucatum				●	Diagonal	0,1 % 1 l/ha	21	Seulement les ribes.
Colletotrichum acucatum				●	Switch	1 kg/ha	7	Sauf les baies de josta.
Botrytis cinerea	●	●	●	●	Switch	1 kg/ha	14/7	Application: Max. 1 traitement par année. Application: Max. 2 traitements par année. (SPe)
Maladies des rameaux	●	●			Flint	0,2-0,3 kg/ha		Application: Max. 3 traitements par parcelle et année.
Rouille	●	●			Penergetic p vigne	0,25 kg/ha		
Maladies des rameaux et des ronces				●	+ Vital	1 l/ha		
Mildiou				●				Sauf les baies de josta.
Botrytis cinerea				●				
Colletotrichum				●				Seulement les grosseilles à maquereau.
Mildiou	●				Booster	0,4 % 4 l/ha	21	Max. 2 traitements par année. (SPe)
Dépérissement des racines		●			Booster	0,4 % 4 l/ha		Pulvériser ou arroser.
Chenilles défoliatrices, tenthrèdes, cheimatobies, phalènes, thrips, punaises	●	●	●	●	Audienz	0,02 %	3	Max. 2 applications par parcelle et par année. Application à l'intervalle de 7/10 jours.
Drosophile du cerisier	●	●	●	●	Audienz	0,02 %	3	Max. 2 traitements par parcelle et année.
Anthronome du framboisier, vers du framboisier	●	●	●		XenTari	0,1 % 1 kg/ha	3	Efficace seulement sur jeune stade larvaire.
Cochenilles diaspinés et lécanines, cheimatobies, acariens tétranyques.				●	Spray Oil 7-E	3,5 %		Application au stade BBCH 00-10 (B-C).
Acariens tétranyques, cheimatobies, cochenilles lécanines	●	●	●		Spray Oil 7-E	3,5 %		Aucune approbation sur les cochenilles lécanines adultes.
Eriophyides gallicoles		●	●		Celos	2 % 1 %		Framboises 1% au débourrement et après la récolte, mûres 1% au débourrement ou 2% longeurs des pousses 10-15 cm. Grand sureau 0,4% au débourrement.
Pucerons	●	●	●	●	Pirimor	0,04 %	21	Application au stade BBCH 00-10 (B-C). (SPe)
Anthronome, vers des framboises		●	●		Techno 10 CS	0,02 %	21	
					Techno 10 CS	0,01 %	21	(SPe)
Acariens tétranyques (œufs et larves)	●	●	●	●	Credo	0,04 %		Application avant la floraison après la récolte. Max. 2 traitements.
Insectes suceurs de feuilles	●	●	●	●	Siltac plus	0,15 %		La bouillie de pulvérisation doit sécher rapidement.
Insectes suceurs de feuilles	●	●	●	●	Vista	2 % 20 l/ha	7	Répéter le traitement selon les besoins.
Engrais foliaire	●	●	●	●	Hi-Grow	1 % 5 l/ha		Miscible avec fongicide.