

Insetticidi

Spettro d'azione	Colture	Prodotti	Osservazioni
		Alberi e arbusti (fuori foresta)	
		Floricoltura e piante verdi	
		Bosso	
		Rose	
		Tappeto erboso e da sport	
Lumache	● ● ● ● ●	Amilon 5 5-7 kg/ha	Tossico per animali domestici.
Piralide del bosso	●	Buxatrap + Pherodis 	Esca con feromone sessuale.
Acaro rosso Acarì dei giardini	● ● ● ● ●	Credo 0,02 %	Fino a 2 settimane dopo il germogliamento o in giugno. (SPe)
Mosca minatrice	● ● ● ● ●	Audienz 0,04-0,08 %	(SPe)
Acarì dei giardini	● ● ● ● ●	Floramite 240 SC 0,04 %	Solamente in serra. Effetto contro tutti gli stadi.
Mosche bianche	● ● ● ● ●	Gepard 0,05 % 0,5 kg/ha	Massimo 2 trattamenti per parcella/anno.
Afidi, tripidi	● ● ● ● ●	Piretro verde  0,3 %	Massimo 4 trattamenti per coltura/anno. Con un intervallo di almeno 7 giorni.
Larve defogliatrici, tripidi, piralide del bosso	● ● ● ● ●	Audienz  0,03-0,04 %	(SPe)
Crisiomelidio Afidi Cimice Nottue terricole Cecidomia Tripidi Mosca del terreno Mosca bianca	● ● ● ● ●	Techno 10 CS 0,01 % 0,1 l/ha	Non può entrare in contatto con piante in fiore e con mielata trattare solo in serata, fuori dal volo delle api (SPe).
Piralide del bosso	●	Techno 10 CS 0,015 %	(SPe)
Tipulidi (larve)	●	Techno 10 CS 0,03 % 0,3 l/ha	Se necessario, ripetere il trattamento dopo 7 giorni (SPe).
Afidi	● ● ● ● ●	Pirimor 0,05 %	Massimo 3 trattamenti.
Piralide del bosso	●	Rapid 0,2 %	(SPe)
Insetti succhiatori	● ● ● ● ●	Siltac plus  0,1-0,15 %	La potiglia polverizzata, deve asciugare rapidamente.
Cocciniglia ostriforme Falena sfogliatrice Cocciniglia nera Ragnetto rosso	● ● ● ● ●	Spray Oil 7-E  3,5 %	Applicazione: in inverno
Cocciniglie nere Afidi Falena sfogliatrice Briobia (ragnetti diversi)	● ● ● ● ●	Winsum  2 %	Applicazione: stadio 13-90 (BBCH). Solo nei giardini.
Nottue	● ● ● ● ●	XenTari  0,1 %	Non utilizzare con tempo freddo.
Afidi Briobia (ragnetti diversi) Mosca bianca Afidi	● ● ● ● ●	Vista  2 %	
	● ● ● ● ●	Ortiga Pro  0,7 %	