



## Fongicides

Spectre	Cultures	Produit	Notes
		Arbres et arbustes (hors forêt)	
		Floriculture et plantes vertes	
		Buis (Buxus)	
		Rosier	
		Gazon d'ornement et de sport	
		Courge d'ornement	
Maladies fongiques des feuilles, Oïdiums des plantes ornementales, Mildiou, Rouilles maladie des taches noires, Botrytis cinerea	● ● ● ● ●	● Flint 0,025-0,04 %	Max. 3 traitements par parcelle et année.
Oïdium Helminthosporium Anthracnose du gazon Rhynchosporium Rouille Fil rouge Taches d'été Dollar spot des graminées	● ● ● ● ●	● Flint 0,5 kg/ha	Max. 3 traitements par parcelle et année.
Gomose Oïdium	● ● ● ● ●	● Flint 0,4 kg/ha	Max. 3 traitements par parcelle et année.
Maladies fongiques des feuilles	● ● ● ● ●	● Flowbrix  0,2 %	Uniquement laurier cerise et rhododendron.
Mildiou Maladie criblée Brûlure des bourgeons	● ● ● ● ●	● Flowbrix  0,2-0,6 %	
Brûlure des bourgeons Chancre	● ● ● ● ●	● Flowbrix  2 % ● Flowbrix  0,2 %	
Oïdium Cloque des azalées Maladies fongiques des feuilles Mildiou Rouille Maladie des taches noires	● ● ● ● ●	● Nimrod 0,1 % ● Legan WG 0,05 %	Uniquement azalées. (SPe) (SPe) (SPe) (SPe)
Maladies causées par des champignons pathogènes du sol Botrytis cinerea Maladies causées par des champignons pathogènes du sol	● ● ● ● ●	● Prestop  0,5 % ● Prestop  0,5 kg/m <sup>3</sup>	sous serre. application au stade 13-65 (BBCH). sous serre. Après la plantation. sous serre. Mélange avec le substrat avant de semer ou de planter.
Oïdium Mildiou	● ● ● ● ●	● Quiz Pro  0,1-0,3 %	
Botrytis cinerea Cylindrocladium buxicola Moisissure des neiges	● ● ● ● ●	● Switch 0,1-0,12 % ● Switch 0,1 % ● Switch 1,5 kg/ha	Max. 2 traitements par parcelle et année. (SPe) Max. 4 traitements. Application de mi-avril à octobre. (SPe) Max. 2 traitements par parcelle et année.