

			GA = Giorni di attesa	
<b>Pomodori</b>				
Graminacee annuali e gramigna	<b>Agil</b>	1,5-2,5 l/ha	56	7-10 giorni dopo il trapianto. (SPe)
Erbicida in piena terra	<b>Condoral SC</b>	0,5 l/ha		Stadio 2-3 foglie delle malerbe.
Ticchiolatura	<b>Sambesi Pro</b>	4 l/ha		
Alternaria, oidio, septoria/noltre peronospora tardiva e marciume dei frutti	<b>Bogard + Ranman Top</b>	0,05 % 0,05 %	3	Massimo 3 trattamenti (SPe)
Oidio	<b>Celos</b>	0,1-0,2 %	3	Monitoraggio della temperatura.
Oidio	<b>Carbyc Pro</b>	0,5-1 %	1	Applicazione: Fase BBCH 12-89.
Alternaria spp., peronospora tardiva e marciume della frutta, Septoria leaf spot disease, Macchia batterica Appassimento batterico del pomodoro	<b>Cuproxat liquido</b>	1,3-1,8 %	3	
	<b>Flowbrix</b>	0,45-0,7 %	3	
	<b>Poltiglia bordolese LG</b>	1,3-1,8 %	3	
Alternaria, oidio, peronospora tardiva e marciume della frutta	<b>Diagonal</b>	1 l/ha	3	Massimo 3 trattamenti per coltura.
Marciume grigio, marciume da Sclerotinia. (Serra)	<b>Pyrus 400 SC</b>	0,125 %	3	Massimo 3 trattamenti per coltura.
Botrytis cinerea	<b>Prestop</b>	0,5 %		
Fusarium spp., Phytophthora spp, Pythium spp., Rizoctonia spp.	<b>Prestop</b>	0,5 %		Irrigazione. (Serra).
Marciume grigio, marciume da Sclerotinia	<b>Switch</b>	0,1 %	3	Massimo 2 trattamenti per coltura. (SPe)
Malattie delle foglie	<b>Quiz Pro</b>	1,5 l/ha		
Bruchi della terra, bruchi della civetta, tripidi	<b>Audienz</b>	0,03-0,04% 0,3-0,4 l/ha	3	(SPe)
Minatori delle foglie di pomodoro	<b>Audienz</b>	0,03% 0,3 l/ha	3	Massimo 2 trattamenti per coltura e anno. (SPe)
Acari del ragno	<b>Credo</b>	0,04 %	3	(SPe)
Afidi, mosche bianche	<b>Oikos</b>	0,15 %	3	In caso di infestazione, 2-3 trattamenti a intervalli di 7-10 giorni.
Afidi, mosche bianche	<b>Piretro verde</b>	2,5 l/ha	3	Massimo 4 trattamenti per coltura e anno. Trattamenti a distanza di almeno 7 giorni l'uno dall'altro.
Afidi di varie specie	<b>Pirimor</b>	0,05 %	7	Delicato per gli organismi benefici. (SPe)
Minatori delle foglie di pomodoro	<b>Rapid</b>	0,15 % 1,5 kg/ha	3	Massimo 2 trattamenti. (SPe)
Insetti succhiatori di foglie	<b>Siltac plus</b>	0,1 %		La miscela spray deve asciugarsi rapidamente.
Afidi, lombrichi,minatori fogliari, tripidi	<b>Techno 10 CS</b>	0,01 % 0,1 l/ha	3	Trattamenti a intervalli di 7-14 giorni.Massimo 2 trattamenti con questo principio attivo. (SPe) solo con autorizzazione speciale. (SPe)
Mosche bianche	<b>Vista</b>	2 % 20 l/ha	7	Non superare i 25 °C durante il trattamento.
Nottue, Tuta assoluta	<b>XenTari</b>	0,1 %		In caso di infestazione 2-3 trattamenti a intervalli di 7-10 giorni.
<b>Insetti utili: contattare il vostro consulente regionale L+G</b>				
Crescita	<b>Dexa Pro</b>	3 l/ha		
Carenza di calcio, marciume del fiore	<b>Basfoliar Combi STIPP</b>	0,2-0,3 % (2-3 l/ha)		Trattare 3-5 volte se necessario al 0.1 %. Inaffiare 5 l/m <sup>2</sup> durante 1 settimana, secondo bisogno.
Carenza di magnesio	<b>Fetrilon-Combi 1</b>	1 kg/ha		Concime fogliare compatibile con le piante.
Bioestimolare organico	<b>Aminopower plus</b>	1-2 l/ha		Miscibile con i fungicidi.