

# Prati e pascoli

## Erbicidi:

### a) Nuova semina

Nuova semina con romice giovane

Miscela trifoglio-graminacee

Lucerna

### Concime starter

**Azofix plus e Fosfix plus** 1-2 l/ha



Miscibile con gli erbicidi e il liquame.

**MCPB LG** 2 l/ha  
**+ Efficax SG** 1,1 kg/ha

Nelle nuove semine, prima del primo taglio. Il trifoglio deve avere 2 vere foglie. Periodo di attesa: 3 settimane per la mucche allattanti, 2 settimane per i bovini fuori dal periodo allattante.

**MCPB LG** 4 l/ha  
**+ Asulam LG** 1 l/ha

Il trifoglio deve avere due foglie vere. Non utilizzarlo in semine di trifoglio alessandrino e trifoglio persiana. Periodo di attesa: 3 settimane per bovine allattanti, 2 settimane per gli altri bovini.

**Lentagran** 1 - 2 kg/ha

In autunno, dopo l'ultima utilizzazione. Periodo di attesa: 3 settimane. 2 settimane per bovini fuori dal periodo di lattazione.

**Efficax SG** 2 x 0,55 kg/ha

Trattamento split. Periodo di attesa: 3 settimane.

**Lentagran 600 EC** 1,5 l/ha

Trattamento frazionato 2 x 0,75 l/ha. Periodo di attesa: 28 giorni.

**Level 2** 0,8 l/ha



5 cm di altezza della coltura. Miscibile con gli erbici.

### b) Trattamento della superficie:

Romice

Romice alpino, felce

Romice giovane e altri dicotiledoni annuali

Ranuncolo

Specie di cardi

Erbacce e infestanti

**Asulam LG** 4 l/ha

**+ Concime liquido** 4 l/ha

Applicazione in primavera e autunno. Prima delle formazioni delle infiorescenze. Periodo di attesa: 3 settimane, 2 settimane per mucche e bovini fuori periodo di lattazione.

**Asulam LG** 6-8 l/ha

**+ Concime liquido** 4 l/ha

Il concime liquido favorisce l'effetto. Periodo di attesa: 3 settimane, 2 settimane per mucche e bovini fuori periodo di lattazione.

**MCPB LG** 4 - 6 l/ha

Nelle nuove semine, prima del primo sfalcio. Il trifoglio deve avere 2 vere foglie. Periodo di attesa: 3 settimane per la mucche con latte, 2 settimane per le mucche e i bovini fuori periodo di lattazione.

**MCPB LG** 4 - 6 l/ha

Nella seconda crescita. Trattamento in tempo di crescita. Periodo di attesa: 3 settimane per animali fuori periodo di lattazione 2 settimane.

**Duplosan KV Combi** 2,5 - 3,25 l/ha

**Landmaster Supreme 480 TF** 3-7,5 l/ha

Trattamento superficiale prima della risemina

### c) Trattamento pianta per pianta

Romice e malerbe a foglia larga.  
Ortiche, senecio jacobea.

Senecio tossico, veratro comune

Cespugli di more, artemisia velenosa, nodo giapponese, cardi perenni, loglio.

Romice comune

Erbacce, erbacce

**Blackex** rapporto di miscelazione 1:2

Colorato in rosso. Trattare pianta per pianta. Periodo di attesa: 3 settimane per vacche con latte. 2 settimane per mucche e bovini fuori periodo di lattazione.

**Deux 4-D** 0,4 - 0,5 %

**Simplex** 0,5-2,5 %

Spruzzatori a zaino/spruzzatori a mano, fino alla fine di agosto. Periodo di attesa: 3 settimane.

**Asulam** 1 %

Periodo di attesa: 3 settimane, animali non in lattazione 2 settimane.

**Landmaster Supreme 480 TF** 0,5-7,5 %

Spruzzatore a zaino / spruzzatore manuale.