

Fungizide

Wirkungsspektrum	Kulturen	Produkt	Hinweise
		Bäume und Sträucher (ausserhalb Forst)	
		Blumenkulturen und Grünpflanzen	
		Buchsbäume (Buxus)	
		Rosen	
		Zier- und Sportrasen	
		Zierkürbisse	
Blattfleckenpilze Echte Mehltaupilze Falscher Mehltau Rostpilze Sternrusstau Botrytis cinerea	● ● ● ●	● Flint 0,025-0,04 %	Maximal 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
Echter Mehltau Helminthosporium Rasenanthrachnose Rhynchosporium Rost Rotfadenkrankheit Sommerflecken Talerfleckenkrankheit	● ● ● ●	● Flint 0,5 kg/ha	Maximal 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
Gummistengelkrankheit Echter Mehltau	● ● ● ●	● Flint 0,4 kg/ha	Maximal 3 Behandlungen pro Kultur.
Blattfleckenpilze Falscher Mehltau Schrotschuss Knospensterben	● ● ● ●	● Flowbrix  0,2-1 % ● Flowbrix  0,2-0,6 %	Nur Kirschlorbeer Nur Rhododendron
Knospensterben Rindenbrandkrankheit	● ● ● ●	● Flowbrix  2 % ● Flowbrix  0,2 %	Nur Blautannen.
Echte Mehltaupilze	● ● ● ●	● Nimrod 0,1 %	
Ohrläppchenkrankheit Blattfleckenpilze Falsche Mehltaupilze Rostpilze Sternrusstau	● ● ● ●	● Legan WG 0,05 %	Nur Azaleen. (GWS) (GWS) (GWS) (GWS)
Krankheit durch pathogene Bodenpilze Botrytis cinerea	● ● ● ●	● Prestop   0,5 %	Im Gewächshaus. Anwendung: Stadium 13-65 (BBCH).
Krankheit durch pathogene Bodenpilze	● ● ● ●	● Prestop   0,5 kg/m ³	Im Gewächshaus. Vor der Aussaat oder Pflanzung mit dem Substrat mischen.
Echter Mehltau Falscher Mehltau	● ● ● ●	● Quiz Pro   0,1-0,3 %	
Botrytis cinerea	● ● ● ●	● Switch 0,1-0,12 %	Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle/Jahr. (GWS)
Cylindrocladium-Trieb- und Blattsterben	● ● ● ●	● Switch 0,1 %	Maximal 4 Behandlungen. Anwendung: Ab Mitte April bis Oktober. (GWS)
Schneeschnitz	● ● ● ●	● Switch 1,5 kg/ha	Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle/Jahr.